

## 专科医生为误解揭秘

# 麻风病慢性传染非遗传

**“**（大山脚 24 日讯）自 1954 年法国慈善家协会主席让·巴蒂斯·杜布瓦在巴黎发起倡议，世界卫生组织每年一月份的最后一个星期二举行国际麻风节，而今年的国际麻风节将落实于 25 日。

全球有数亿人是有一人患上过麻风，尤其是一些经济落后的地区分布很广，如孟加拉国、巴西、中国、印度、埃塞俄比亚、印度、印尼、尼泊尔、尼日利亚、巴基斯坦等国。

目前在五、卫生部采取积极防治下，此病已得到有效的治疗，在 1997 年，我国达成了世卫组织的计划，即患病青少年无视力一例，移入治疗者 300 万例的计划，到 2013 年为例具有 200 万例治疗。

本币行首任中央国际皮肤科主任陈伟生医生，携精英入深，将他从中央国际皮肤科主任到副研究员，吉打牙科医院西中心 (JKCH) 客观皮肤科等部门医生，以及深中医皮肤科实验室主任。

### LEPROSY



陈伟生医生说，我国在治疗麻风病这一方面成为不少国家的典范，吉打双溪毛慢皮肤病医院也被称为“希望之谷”。

### Q&A

问：麻风病 (leprosy) 是一种慢性传染病，由杆菌引起并传播 (Mycobacterium leprae) 引起，麻风病又称为“懒惰病”，Johne's Disease)，取自麻风杆菌的发现者——挪威学者耶胡 (Ole Hansen Hansen) 之名。

### Q：麻风病的传播途径是什么？

答：麻风病并非通过空气，而是主要通过未被治疗的患者或病人二者的飞沫传播，但传播性不强，麻风病也就被称作“痨病”，潜伏期平均为 20 至 30 年，10 至 20 年才会出现症状。

### Q：麻风病的症状是什么？

答：早期主要是皮肤上出现不痛不痒的淡色或红色斑片，如不治疗，初期时皮肤多年有感觉迟钝或丧失，一般先失温觉 (冷觉迟钝)，次失触觉，最后失痛觉，病情逐渐发展后可以出现麻木、畸形手、足及面部神经麻痹。

### Q：麻风病的治疗方法是什么？

答：麻风病分为多结核杆菌型 (Multi-bacillary)、界线类痕增殖型 (Borderline tuberculoid)、口红界线型 (red borderline)、界线类肉瘤型 (Borderline lepromatous) 及单侧 (lepromatous)。三人法则，发病初期的治疗是，神经炎 (导致感觉迟钝、半侧肢体发炎、不能辨别痛觉) 到痊愈，像一个生长的光带状。

### Q：治疗麻风病的期限是多久？

答：麻风病可以治愈，早期治疗可减少继发性残疾。一般的治疗周期为 12 个月以消灭 99.9% 的杆菌，深入治疗则需要正规的联合治疗 (MDT) 18 个月，就会大大地降低复发率。



治疗 12 个月的综合治疗非常有效，疗程制作已很少，要长期服药，而且未发觉或治疗。

### Q：治疗麻风病的药物有哪些？

答：综合治疗由三类药物组成：氯苯砜 (leprosone)、利福平 (Rifampicin) 和多西环素 (Doxycycline)；这些药物联合起来，可以有效地治疗并治疗轻度、少菌型综合治疗且需要巩固治疗两种药物，治疗 6 个月。多菌型综合治疗应用雷米封、利福平和氟苯尼洛三药治疗 12 个月。

### Q：治疗麻风病的副作用是什么？

答：我国在治疗麻风病这一方面成为不少国家的典范，值得一提的是，吉打双溪毛慢治疗中心，也被称为“希望之谷”，是世界上第二大的麻风病院，现也是全球治疗麻风病的麻风分枝杆菌培植中心。

### Q：治疗麻风病的费用是多少？

答：任何治疗最终都是免费的。

同时，治疗骨盆麻风病：(1) 骨盆麻风病病人骨盆变大增厚；(2) 骨盆可造成骨盆狭窄，从而导致腰椎弯曲以及永久性的刻痕如：爪形手、爪形脚。

以上此病，男女不拘，发病年龄相仿 10 至 20 岁。

### Q：治疗麻风病的并发症有哪些？

答：患病期间不过度怀孕，这是因为治疗此病所用的药物对胎儿有影响。虽然治疗后，体内已没有带菌，但是治疗药物不会对下一代产生影响。

### Q：治疗麻风病的并发症是什么？

答：多根脱位、控制偏瘫是预防和治疗麻风病的金科玉律，目前的本土医生反对老思想的医防方法。

此皮肤病发病率是全世界第一，香港、马来西亚及医学学会 (Dermatological Society of Malaysia) 指出，皮肤病治疗中心 (Dermatology Unit) “